



¡¡¡ADVERTENCIA SOBRE DROGAS EMERGENTES!!!

¡Nitazenos y medetomidina en el suministro de medicamentos de la ciudad de Nueva York!



Nitazenos

Los nitazenos son cada vez más comunes en el suministro de medicamentos, ¡así que lea a continuación para obtener más información!

Los nitazenos son opioides sintéticos con potencias variables; en algunas muestras se han analizado potencias hasta diez veces mayores que las del fentanilo.

- Signos de sobredosis (use Narcan y llame al 911): Respiración lenta y superficial, labios y tez azulados o grisáceos, desmayo, coma y muerte.
- Signos de abstinencia (pueden requerir atención médica): Sudoración excesiva, piernas inquietas, fiebre, mareos, síntomas parecidos a los de la gripe, desmayos, ansiedad y ataques de pánico.

Medetomidina

La medetomidina se está volviendo cada vez más común en el suministro de medicamentos, ¡así que lea a continuación para obtener más información!


Medetomidina es un tranquilizante similar a la xilazina, pero significativamente más potente: las pruebas actuales muestran que es 100 veces más potente que la xilazina.

- Signos de abstinencia (pueden requerir atención médica): Frecuencia cardíaca rápida (>100 latidos por minuto), presión arterial peligrosamente alta (>180/100), náuseas y vómitos incontrolables, temblores, sudoración excesiva y niveles cambiantes de alerta.
- Efectos del uso: Sedación intensa, presión arterial baja, ritmo cardíaco lento, mareos, cansancio extremo, dificultad para respirar, náuseas, visión borrosa y confusión.
- Asociación con el uso de opioides y respuesta a la sobredosis: Si bien la medetomidina no es un opioide, casi siempre se usa con opioides. Esto significa que, después de administrar Narcan a una persona que muestra signos de sobredosis de opioides, es posible que permanezca sedado y sin respuesta, incluso si la sobredosis se revierte con éxito. Para saber cuándo se ha revertido una sobredosis, **Asegúrese de que la persona respire al menos una vez cada 5 segundos y que no esté pálida, gris o azul.**
- Deshidratación y mayor riesgo de sobredosis: El uso de medetomidina provoca micción más frecuente y aumenta el riesgo de deshidratación, además de sobredosis. **Si lo usas, ¡hidrátate con frecuencia!**

SI USA DROGAS CALLEJERAS...



**¡USE NARCAN
Y LLAME AL 911 SI
SUFRE UNA
SOBREDOSIS!**




¡NO USE SOLO!



**¡UTILIZAR
LENTAMENTE!**



**¡MANTÉNGASE
CALIENTE!**



**¡HIDRÁTATE CON
FRECUENCIA!**

¡UTILICE TIRAS DE PRUEBA Y LABORATORIOS DE DETECCIÓN DE DROGAS!

Verifique los suministros de medicamentos para detectar nitazenos y medetomidina usando tiras de prueba de drogas para nitazenos y medetomidina. O utilice un laboratorio de control de drogas con OnPoint NYC, VOCAL-NY, Harlem United, BOOM!Health o Housing Works (Cylar House).

Si cree que alguien está sufriendo una sobredosis, **¡use Narcan y llame al 911!**

**HAGA CLIC O TOQUE PARA OBTENER
TIRAS DE PRUEBA GRATIS**

**Partnerships for
Community Wellness**

